

## *Patiënten van de GGZ als hoog risico groep voor behandeling van suïcidaliteit*

W.J.G. KRIJGER, R.F.P. DE WINTER, A.M. VAN HEMERT

[J.KRIJGER@PARNASSIA.NL](mailto:J.KRIJGER@PARNASSIA.NL)

### ACHTERGROND

Het is niet mogelijk gebleken om suïcide op een individuele basis betrouwbaar te voorspellen. Bij gebrek hieraan kunnen interventies voor de preventie van suïcides mogelijksterwijs gericht worden op geïdentificeerde groepen met een sterk verhoogd risico. De populatie van patiënten die in zorg is bij de GGZ kan een dergelijk groep zijn.

### DOEL

Bepalen van het risico van suïcide en van risicofactoren voor suïcide bij patiënten die bekend zijn binnen de GGZ in vergelijking met de bevolking als geheel.

### METHODEN

Voor de periode van 1 januari 2000 t/m 31 december 2009 zijn gegevens verzameld van de suïcides van alle volwassen Haagse inwoners die zijn ingeschreven bij de Parnassia Bavo Groep (PBG). Voor dezelfde periode zijn bij het CBS gegevens opgevraagd over alle suïcides onder volwassen inwoners van Den Haag. Als risicofactoren is voor beide groepen informatie beschikbaar over leeftijd, geslacht, etniciteit en socio-economisch status. Uit het casusregister van de PBG zijn gegevens gebruikt over de totale groep van volwassen Haagse patiënten die in onderzoeksperiode in zorg was. Gegevens van de gemeente zijn gebruikt voor de Haagse bevolking als geheel.

### RESULTATEN

In de onderzoeksperiode waren er 177 suïcides onder volwassen Haagse inwoners die bekend waren bij de PBG en 482 onder alle volwassen Haagse inwoners. In vergelijking met de Nederlandse bevolking was het gestandaardiseerde relatieve suïciderisico voor de inwoners van Den Haag 1,2 (95% betr.int. 1,1-1,3). Eerste analyses tonen voor de GGZ-populatie een 6-voudig verhoogd risico. Voorlopige resultaten tonen verschillende risicofactoren voor suïcide in de beide populaties.

### CONCLUSIE

Eerste analyses tonen een duidelijk verhoogd suïciderisico binnen de GGZ-populatie in vergelijking met de bevolking als geheel. Nadere analyses volgen voor de subgroep van GGZ-patiënten die klinisch was opgenomen in de GGZ en voor de risicofactoren voor suïcide in de verschillende deelpopulaties.